RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

APO-NORFLOX

Comprimès de norfloxacine USP

Apo-Norflox est la marque déposée d'Apotex Inc. pour la substance appelée norfloxacine. Ce médicament **ne peut être obtenu que sur ordonnance du médecin**. La norfloxacine appartient au groupe des antibactériens. Ces derniers sont utilisés pour traiter les infections causées par des microbes ou des bactèries; la norfloxacine agit sur une grande variété de bactéries de differentes espèces, en les tuant ou en les empêchant de se développer.

La norfloxacine a été prescrite par votre médecin pour traiter une infection des voies génito-urinaires.

Avis important: Ce médicament vous est prescrit pour le traitement de l'infection dont vous êtes atteint actuellement. **Ne pas le donner à d'autres personnes ni l'utiliser pour traiter d'autres infections.**

Garder tous les médicaments hors de la portée des enfants.

Lire les informations suivantes avec attention. **Si vous désirez des explications ou de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Ce qu'il faut savoir avant de prendre ce médicament

Il est possible que ce médicament ne convienne pas à certaines personnes. Si vous croyez que l'une des situations suivantes s'applique à votre cas, faites-le savoir à votre médecin:

- Vous avez déjà pris de la norfloxacine ou un autre médicament de la même classe—par exemple, de la ciprofloxacine (Cipro) ou de l'acide nalidixique (NegGram)—et vous avez manifesté une allergie ou avez présenté des reactions défavorables.
- Vous êtes atteint d'une maladie des reins.
- Vous avez dèjà fait des convulsions.
- Vous êtes enceinte ou avez l'intention de le devenir, ou encore vous allaitez ou avez l'intention de le faire.
- Informez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants: probénécide, nitrofurantoïne, théophylline, cyclosporine, médicaments qui éclaircissent le sang, multivitamines ou produits qui contiennent du fer, du zinc ou de la caféine.
- Prévenez également votre médecin si vous prenez tout autre médicament (délivré sur ordonnance ou obtenu en vente libre).

Ce médicament n'est pas recommandé chez les enfants.

Mode d'emploi du médicament

Suivez rigoureusement les directives de votre médecin et prenez le médicament pendant le nombre exact de jours indiques. **N'interrompez pas votre traitement avant la fin, même si vous vous sentez mieux. Si vous cessez le traitement trop tôt, les symptômes risquent de réapparaître.**

Il est préférable de prendre ce médicament avec un **grand verre d'eau**, 1 heure **avant** ou 2 heures **après** avoir pris un repas ou du lait. Il est recommandé de boire beaucoup de liquide, eau ou jus, tous les jours, sauf avis contraire de votre médecin. Apo-Norflox devrait être pris deux heures avant ou après la prise de supplèments de fer, de zinc ou de multivitamines qui en contiennent.

Le sucralfate (Sulcrate) et les antiacides (tels Diovol, Maalox et Amphojel) peuvent interagir avec la norfloxacine. Si vous devez prendre ces médicament, faites-le au moins 2 à 3 heures avant ou après la prise d'Apo-Norflox.

Si vous oubliez une dose d'Apo-Norflox prenez la dose suivante normale à l'heure prévue. **Ne prenez jamais** 2 doses de médicament à la fois pour compenser un oubli. Si, par inadvertance, vous avez pris trop de comprimés, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien **le plus tôt possible.**

Au cours du traitement, si des problèmes de santé apparaissent ou si vous désirez commencer un traitement avec un autre médicament, que ce soit un médicament délivré sur ordonnance ou obtenu en vente libre, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Conservez les comprimés à la température de 15 à 30^{0}C dans un contenant hermètique, à l'abri de la chaleur et de la lumière; ne pas les garder dans une pièce humide telle que la salle de bain ou la cuisine.

Rèactions défavorables au médicament—ce qu'il convient de faire

En plus de l'effet désiré, tout médicament, y compris la norfloxacine, peut provoquer des réactions défavorables. La plupart des personnes ne ressentent aucun effet indésirable à la prise de ce

médicament; toutefois, consultez votre médecin ou votre pharmacien dés que vous notez l'une des rèactions suivantes:

- Etourdissements, sensation de tête légère ou mal de tête.
- Si vous éprouvez l'une des réactions mentionnées ci-dessus ou si vous présentez des troubles visuels, évitez de conduire un véhicule ou de participer à des activités nécessitant de la vigilance, de la coordination ou une bonne vision.

Les autres réactions défavorables possibles mais moins fréquentes sont les suivantes:

confusion, convulsions (cris d'épilepsie), enflure ou inflammation des articulations, douleur

abdominale ou gastrique accompagnée d'indigestion, de flatulence (gaz), de nausées, de vomissements, de diarrhée ou de perle d'appétit, brûlures d'estomac, éruptions cutanées, somnolence et troubles du sommeil.

Cesser de prendre Apo-Norflox et consultez votre médecin immédiatement Si les symptômes suivants se manifestent.

Si vous développez une rèaction allergique telle que enflure du visage, des lèvres ou de la gorge (accompagnée de difficulté à respirer ou avaler) ou de l'urticaire.

Si vous développez des réactions cutanées telles que réaction grave aux rayons du soleil, rash, rougeurs ou augmentation de la sensibilité de la peau ou des yeux aux rayons du soleil, enflure ou formation de cloques.

Ne vous exposer pas directement aux rayons du soleil, portez des vêtements protecteurs et utilisez une lotion solaire qui forme un écran protecteur.

Si vous développez de la douleur dans vos tendons (tendinite, rupture de tendons). Si vous constatez une détérioration des symptômes de myasthénie grave.

Si vous développez des signes de problèmes mentaux comme le changement d'humeur tel que l'anxiété ou la dépression.

Certaines personnes peuvent prèsenter d'autres rèactions défavorables. Si vous notez une manifestation inhabituelle, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

Principe actif:

Chaque comprimé d'Apo-Norflox renferme 400 mg de norfloxacine.

FABRICANT D'APO-NORFLOX

Apotex Inc.
150 Signet Drive
Weston, Ontario
M9L 1T9

RAPPEL

Ce médicament vous a été prescrit à vous personnellement. N'en donnez à personne d'autre.

Si vous avez besoin de plus amples renseignements ou de conseils, veuillez contacter votre médecin ou pharmacien.

APOTEX INC.
SOCIÉTÉ PHARMACEUTIQUE ENTIÈREMENT CANADIENNE

203425